## CADUCITÉ DU GENRE CONOPHARYNGIA G. Don EXCLUSION DES APOCYNACEAE DE C. LONGIFOLIA (Lam.) G. Don.

par P. BOITEAU

Le genre Conopharyngia G. Don (Gen. Syst. Gard. Bot. 4: 94, 1897) était basé sur deux espèces précédemment rangées par LAMARCK dans le genre Plumeria L... à savoir:

- Plumeria retusa Lamarck, Encycl. 2: 542 (1786);
- Plumeria longifolia Lamarck, loc. cit.

La première de ces espèces, *Plumeria retusa* Lam., est le type du genre *Pandaca* Noronha ex Thouars (Gen. Nova Madag.: 10, 1806), récemment repris par MARKGRAF (Adansonia, sér. 2, 10: 29, 1970).

Elle est donc devenue Pandaca retusa (Lam.) Mgf.

La seconde de ces espèces, Phuneria longifolia Lam., est basée sur une récolte de Commerson qui figure toujours dans l'herbier Lamarck sous ce nom et a servi de type au Conopharyngia longifolia (Lam.) G. Don. Cette récolte de Commerson comprenait plusieurs parts. Deux d'entre elles figurent dans l'herbier A. De JUSSEU et ont été rangées par ADBLET au nº 7022 après son Potalia anuara Aubl. Cet auteur avait donc déjà considéré qu'il s'agissait d'une Loganiaceae et non d'une Apocymaceae. La dernière part de COMMERSON a été rangée dans l'herbier général de Madagascar. A. J. M. LEEVUNDERG l'a étudiée en 1960 et déterminée comme appartenant à l'espèce Anthocleista urbaniana Gilg (voir Acta Botanica Neerl. 10 : 13, 1961).

Précédemment, d'ailleurs, M. PICHON, dans un travail d'ensemble sur le genre Tabernaemontana (Notulae Systematicae 13 : 231, 1948, note 3 en bas de page) avait déjà attribué, avec doute, cette espèce au genre Anthocleista.

Conopharyngia longifolia (Lam.) G. Don doit donc être exclu des Apocynaceae et ranger parmi les Loganiaceae.

## Anthocleista longifolia (Lamark) Boiteau, comb. nov.

- Plumeria longifolia LAMARCK, Encycl. 2 : 542 (1786).
- Conopharyngia longifolia G. Don, Gen. Syst. Gard. Bot. 4: 94 (1837); A. DC, Prodr.
  8: 378 (1844).
- Anthocleista urbaniana Gil.G. Bot. Jahrb. 17: 584 (1893).
- Tabernaemontana longifolia PALACKY, Catal. Plant. Madag. 3: 30 (1907),

Le genre Conopharyngia G. Don reposant sur deux espèces dont l'une est exclue des Apocynacées, et l'autre attribuée au genre Pandaca Noronha ex Thouars, antérieurement décrit, devient donc caduc au regard de la nomenclature.

Quant aux « Conopharyniga » africains, sensu STAPF in DYER, Flora of Tropical Africa (1904), ils feront l'objet d'une mise au point ultérieure.

Laboratoire de Phanérogamie, Muséum-Paris.